


Influenza A/H1N1 Il punto della situazione al 15 dicembre 2009

Incidenza dell'influenza per classi di età nella stagione 2009 - 2010




Il livello del picco epidemico raggiunto nell'attuale stagione influenzale è superiore a quello osservato in molte stagioni influenzali precedenti tranne che in quelle del 2002-2003 e 2004-2005. In quest'ultima è stato osservato il livello maggiore di incidenza mai raggiunto negli ultimi dieci anni.

Regione	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
PIEMONTE	40	180	51869	3,47	33	9,72	45	7,7	84	2,7	18	1,55
VAL D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.A. BOLZANO	14	104	25910	4,01	5	4,48	14	3,99	82	4,98	3	0,62
P.A. TRENTO	11	83	14373	5,77	21	17,45	30	10,88	32	4,05	0	0,00
VENETO	55	235	71220	3,29	51	11,05	75	8,36	106	2,49	3	0,19
EMILIA R.	66	353	83966	4,2	55	8,48	153	12,6	140	2,94	5	0,28
MARCHE *	19	248	21816	11,36	56	16,64	132	21,16	54	5,91	6	1,94
LAZIO	53	246	66693	3,68	35	7,01	56	6,31	125	3,05	30	2,52
MOLISE	7	10	8699	1,14	0	0,00	4	9,43	6	0,99	0	0,00
CAMPANIA	27	143	34550	4,13	31	9,59	57	8,13	48	2,48	7	1,4
BASILICATA	3	6	3803	1,57	1	4,14	2	2,56	3	1,38	0	0,00
SARDEGNA	7	162	7965	20,33	41	43,06	77	45,29	41	9,84	3	2,61
ABRUZZO	2	2	1485	1,35	1	1,95	1	1,05	0	0,00	0	0,00
CALABRIA	2	11	3126	3,52	0	0,00	1	12,99	9	3,60	1	1,81
FRIULI V.G.	12	91	16113	5,65	17	13,49	17	8,11	52	5,67	5	1,39
LIGURIA	33	99	41003	2,41	15	7,08	33	7,61	48	2,00	3	0,28
LOMBARDIA	133	391	179940	2,17	109	6,39	80	2,66	184	1,91	18	0,49
PUGLIA	75	377	96610	3,90	69	10,70	108	8,05	187	3,11	13	0,79
SICILIA	36	209	45293	4,61	33	14,32	38	7,94	130	4,29	8	1,02
TOSCANA	37	109	46449	2,35	18	8,90	22	4,35	57	2,00	12	1,10
UMBRIA	11	53	13113	4,04	17	11,29	24	7,79	9	1,45	3	1,29

* l'incidenza totale osservata nella regione Marche è influenzata fortemente dall'alto numero di casi nella fascia di età pediatrica segnalati soltanto da un ristretto numero di pediatri e non è quindi rappresentativa di tutta la regione.

Incidenza di Influenza nella stagione 2009-2010 ABRUZZO



Casi che necessitano di assistenza respiratoria

Le Regioni hanno segnalato fino ad oggi al Ministero 811 ricoveri in ospedale per casi severi di influenza, di cui 439 hanno richiesto assistenza respiratoria: una quota pari allo 0,012 per cento del totale stimato delle persone che hanno contratto la nuova influenza A.

Vittime correlate all'influenza A

La percentuale delle vittime correlate all'influenza A è stata aggiornata rispetto al numero totale di casi stimati da Influnet ed è pari a **0,0042** per cento dei malati, contro lo 0,2 per cento delle vittime correlate alla normale influenza. Va considerato che essendo la percentuale delle vittime calcolata considerando i casi clinici segnalati al sistema di sorveglianza, poiché questi sono molto probabilmente sottostimati, il valore potrebbe essere addirittura inferiore alla stima sopra riportata.

Alle ore 17,00 del 15 Dicembre le vittime correlate alla nuova influenza A sono **149**. Tale numero comprende i casi per i quali le autorità sanitarie regionali hanno confermato l'accertamento dell'infezione da nuovo virus A/H1N1.

Situazione in Italia

Totale vittime 149

Regioni

Abruzzo 3, Basilicata 1, Calabria 16, Campania 32, Emilia Romagna 10, Lazio 14, Liguria 4, Lombardia 9, Marche 1, Molise 3, Piemonte 8, Puglia 19, Sicilia 11, Toscana 4, Umbria 5, Veneto 8
P.A. Bolzano 1

Situazione europea (fonte ECDC)

**Totale vittime
di cui**

1371
Gran Bretagna 283, Spagna 208, Francia 177

Situazione mondiale (fonte ECDC)

Totale vittime

11033

di cui:

Stati Uniti d'America 1929, Brasile 1632, Messico 732, Argentina 616

Accessi al pronto soccorso

La rete sentinella di strutture di pronto soccorso ha segnalato che nella 49° settimana (30 novembre – 6 dicembre), il 5.4% di tutte le persone che si sono rivolte al pronto soccorso è stato visitato per sindrome respiratoria acuta. Di questi, il 26% è stato ricoverato

Si conferma per la terza settimana consecutiva la riduzione degli accessi al pronto soccorso e del numero dei ricoveri per sindrome respiratoria acuta, per tutte le fasce d'età. L'analisi dei dati nazionali si basa sulle informazioni provenienti da 49 dei 56 pronto soccorso che hanno aderito alla sorveglianza. Pur risentendo delle diverse modalità di accesso al pronto soccorso, il sistema consente di rilevare tempestivamente l'andamento degli accessi per sindrome respiratoria, indicatore indiretto di una maggiore attività dei virus influenzali.

Vaccinazione della popolazione

Nella 49° settimana (30 novembre – 6 dicembre) sono state somministrate 52.662 dosi. Dall'inizio della campagna vaccinale, complessivamente sono state somministrate, per le categorie considerate prioritarie per la prima fase della vaccinazione, 689.172 prime dosi e 5.730 seconde dosi.

Gli operatori sanitari e sociosanitari che si sono vaccinati sono 153.852, pari al 14,64% del totale.

Sono state vaccinate 20.491 donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza (copertura stimata pari al 11,4%), mentre alle persone di età compresa tra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio sono state somministrate 438.204 dosi (10.4%).

Alcune Regioni hanno inoltre iniziato a vaccinare i bambini e i giovani adulti tra i sei mesi e i 27 anni senza condizioni di rischio e i portatori di almeno una delle condizioni di rischio di età superiore ai 65 anni per un totale di 11.468 dosi somministrate.

Attualmente le Regioni sono state sollecitate a vaccinare con la maggiore rapidità le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza e i soggetti dai 6 mesi ai 64 anni appartenenti alle categorie a rischio per patologie preesistenti, con priorità assoluta per i bambini appartenenti a tali categorie

Per saperne di più: www.ministerosalute.it ; www.fermailvirus.it